

# INFORMATOR

## Amputacja piersi


### Szanowna Pani,

Badanie wykazało zmianę w piersi, która wykazuje cechy zmiany złośliwej. Do jej dokładnego zbadania i wyleczenia konieczny jest zabieg operacyjny. Przed operacją lekarz omówi z Panią konieczność, możliwości i przebieg leczenia. Powinna Pani poznać ryzyko i skutki operacji, aby mogła Pani podjąć decyzję i wyrazić zgodę na operację. Niniejszy dokument ma pomóc w przygotowaniach do rozmowy z lekarzem oraz w udokumentowaniu najważniejszych punktów.

### Jak przebiega operacja?


Wybór opisanych poniżej metod operacji i koniecznych zabiegów uzupełniających zależy od wyniku badania wycinka podczas operacji.

#### Amputacja prosta



- Amputacja prosta piersi  
Operacja polega na usunięciu całej piersi w znieczuleniu ogólnym. Podczas tego zabiegu nie usuwa się węzłów chłonnych dołu pachwowego. Cięcia wykonuje się wrzecionowato dookoła piersi. Leczenie to zazwyczaj stosuje się w przypadku raka przewodowego nienaciekającego (DCIS) i nawrotu choroby nowotworowej u pacjentek, które wcześniej były poddane zabiegom oszczędzającym piersi.

#### Zmodyfikowana radykalna amputacja piersi



- Zmodyfikowana radykalna mastektomia  
Operacja polega na amputacji piersi oraz wycięciu węzłów chłonnych pachowych. Decyzja o tym, ile węzłów zostanie wyciętych podjęta zostanie po zakwalifikowaniu Pani przez lekarza, który analizuje umiejscowienie i wielkość guza oraz zmiany widoczne w węzłach chłonnych. Wskazaniem do tego zabiegu jest zwykle guz naciekający (złośliwy)
- Radykalna mastektomia  
Operacja polega na amputacji piersi, węzłów chłonnych pachowych i mięśnia piersiowego większego. Obecnie jest to zabieg wykonywany bardzo rzadko, gdyż badania pokazały, że usunięcie mięśnia w żaden sposób nie wpływa na rokowania, a znacznie pogarsza jakość życia pacjentek po zabiegu.

jestemchory.pl

### Dodatkowe zabiegi:

- Usunięcie węzłów chłonnych z dołu pachowego  
Aby usunąć wszystkie złośliwe zmiany tkankowe i wykluczyć rozprzestrzenianie się choroby, z reguły usuwa się także węzły chłonne z dołu pachowego w otaczającej tkance. Naczynia krwionośne i nerwy zostają przy tym w miarę możliwości zachowane.