

INFORMATOR

operacja powiększania piersi

Szanowna Pani,

Ma u Pani zostać przeprowadzona operacja powiększenia i/lub ujędrnienia piersi. Przed operacją lekarz przeprowadzi z Panią rozmowę dotyczącą możliwości i przebiegu zabiegu. Powinna Pani poznać ryzyko i skutki operacji, a także możliwe alternatywy zabiegu, zanim podejmie Pani decyzję i wyrazi zgodę na operację. Niniejszy dokument ma pomóc w przygotowaniach do rozmowy z lekarzem oraz w udokumentowaniu najważniejszych punktów.

Kiedy operacja ma sens?

Piersi zostają powiększane przez zastosowanie implantów. Dobre i długotrwałe wyniki przynoszą implanty wypełnione żelem silikonowym, solą fizjologiczną lub roztworem koloidowym.

Odbudowa za pomocą tkanek własnych jest dużo bardziej poważnym i obciążającym zabiegiem. Dodatkowo, warunkiem jest pobranie tkanki z obszaru, w którym występuje nadmiar tkanek. Pobranie związane jest zawsze z powstaniem dodatkowych blizn. Poza tym tkanki własne przechodzą również procesy starzenia i poddane są obciążeniom.

Dzięki operacyjnemu powiększeniu piersi, możliwe jest uzyskanie harmonijnych proporcji ciała i poprawienie jego wizerunku. Piersi po operacji będą pełniejsze a górne części wydatniej zaznaczone. Przy obniżonej jędrności operacja daje również efekt podniesienia piersi.

Alternatywą zabiegu jest noszenie powiększających biustonoszy (typu push-up). Iniekcje kwasu hialuronowego są alternatywą powiększenia piersi za pomocą implantów jednak mogą dawać powikłania w postaci zgrubień i zwłóknień piersi.

Lekarz wyjaśni Pani, dlaczego w Pani przypadku wskazana jest operacja powiększenia/ujędrnienia piersi.

Jak przebiega operacja?

Operacja przebiega w znieczuleniu ogólnym. O szczegółach i ryzyku znieczulenia poinformuje Panią anestezjolog.

Przed zabiegiem piersi zostają dokładnie zmierzone, a późniejszy przebieg nacięć rysuje się na skórze. Przez jak najmniejsze nacięcia skóry na granicy brodawki, w fałdzie podpiersiowym lub w dole pachowym wprowadza się implanty (poduszcзки z tworzywa sztucznego wypełnionej żelem silikonowym, solą fizjologiczną, roztworem koloidowym lub innym materiałem).

Zwykle powstają okrągła blizna na brzegu otoczki brodawki sutkowe lub mniej lub bardziej długa blizna (4-5 cm) w fałdzie podpiersiowym. Przy tym sposobie pierś przyjmuje swój kształt już bezpośrednio po zabiegu i po zakończeniu gojenia się ran.

Implanty lokalizuje się nad lub pod mięśniem piersiowym.

