

INFORMATOR

Rekonstrukcja brodawki

Szanowna Pani,

Rekonstrukcja brodawki piersiowej jest zabiegiem wykonywanym po mastektomii i rekonstrukcji piersi, stosowanych w leczeniu raka piersi. Ta dodatkowa rekonstrukcja uzupełnia wygląd chirurgicznie zrekonstruowanej piersi i sprawia, że jej wygląd jest tak naturalny, jak to tylko możliwe. Przy obecnym rozwoju medycyny, rekonstrukcja brodawki piersiowej daje najbardziej naturalne efekty, jakie można osiągnąć po amputacji piersi. Pozwala kobietom, które wygrały walkę z rakiem, nadal czuć się kobieco.

Metody rekonstrukcji brodawki

Rekonstrukcja brodawki może być wykonywana od razu podczas **rekonstrukcji piersi**, a także równocześnie z mastektomią i rekonstrukcją piersi. Brodawka odtwarzana bywa także w późniejszym terminie. Okres pomiędzy dwoma operacjami (rekonstrukcją piersi i rekonstrukcją brodawki) zazwyczaj wynosi od dwóch do trzech miesięcy. Jest kilka metod tej operacji:

- przeszczepienie brodawki piersi pacjentki od razu podczas mastektomii i rekonstrukcji piersi – jest to jednak rozwiązanie możliwe, jeśli w tkance brodawki nie ma komórek rakowych, trzeba się także zdecydować na ten zabieg jeszcze przed mastektomią;
- rekonstrukcja sutka i otoczki sutkowej z użyciem skóry pacjentki – taki zabieg można wykonać później, po mastektomii i rekonstrukcji piersi, najpierw przeszczepia się skórę i nadaje jej odpowiedni kształt, a po zagojeniu tatuuje się odpowiedni kolor sutka;
- rekonstrukcja sutka i otoczki sutkowej z użyciem silikonu – ten rodzaj rekonstrukcji pozwala na mastektomię, rekonstrukcję piersi i rekonstrukcję sutka w różnych terminach.

Przy mastektomii podskórnej możliwe jest pozostawienie brodawki piersi na swoim miejscu. Rekonstrukcja piersi nie jest wtedy konieczna.

Rekonstrukcja sutka to istotna część rekonstrukcji piersi, pozwalająca na uzyskanie estetycznego wyglądu. Wiele kobiet po utracie piersi czuje się nieatrakcyjnie, gdyż pozbawione są tak ważnego atrybutu kobiecości. Operacja rekonstrukcji piersi i sutków pozwala im na powrót do naturalnego wyglądu. Niektóre kobiety natomiast godzą się ze swoim wyglądem po amputacji i nie decydują się na rekonstrukcję. Kobieta może także zakupić silikonową protezę, którą przykleja tak, by imitowała naturalną brodawkę.

Przebieg zabiegu

Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Trwa około 30 min. Zdjęcie szwów po 5-7 dniach. Zalecana jest też wizyta kontrolna po miesiącu.

Przeciwwskazania

- choroby autoimmunologiczne,
- problemy z wątrobą i nerkami,
- zaburzenia krzepliwości krwi,
- przewlekłe infekcje

Zabiegowi nie mogą się poddać kobiety, u których stwierdzono zmiany wykryte po badaniu USG piersi

Po rekonstrukcji

Po zabiegu można spodziewać się opuchlizny i dyskomfortu. W ciągu pierwszych 1-2 dni po zabiegu mogą występować dolegliwości bólowe wymagające stosowania doustnych środków przeciwbólowych. Możliwe jest wystąpienie niewielkiego obrzęku i zasinień ustępujących w ciągu kilku dni.

Zaleca się, aby po rekonstrukcji sutka i piersi: